

# PG-SGA がんりハ運用フロー記録シート

PT × NST 共有用 / 点数・判定・症状・方針を1枚で整理

## 基本情報

患者ID \_\_\_\_\_

評価日 \_\_\_\_\_

評価者 \_\_\_\_\_

場所 \_\_\_\_\_

### Step 1 赤旗確認

急変・嘔下・脱水

- ・発熱・むせ
- ・脱水・疼痛

### Step 2 症状整理

摂取・体重・NIS

- ・摂取量
- ・体重変化

### Step 3 最小評価

点数・判定・活動

- ・スコア
- ・A/B/C

### Step 4 方針再評

共有・負荷・次回

- ・今日の方針
- ・再評価

## Step 1-2 確認欄

発熱  脱水  むせ  疼痛

悪心  口内炎  味覚  便秘

主症状 \_\_\_\_\_  
ex) 悪心、早期飽満、むせ

摂取低下の理由 \_\_\_\_\_  
ex) 朝食3割、昼は冷たい…

体重変化 / 食事量 \_\_\_\_\_  
ex) 1週で -1.5 kg、補液あり

## Step 3 最小評価

PG-SGA スコア \_\_\_\_\_ 点  A  B  C

活動維持  活動低下  臥床増加

食前  食後  補液中  制吐後  鎮痛後

所見・根拠 \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

## Step 4 方針 / 再評価

継続  軽減  分割  見送り  NST  ST

今日の目標 \_\_\_\_\_  
ex) 食後の疲労を増やさず離床を維持

介入内容 \_\_\_\_\_  
ex) 座位10分、立位1分×2、休憩多め

再評価条件 / 観察 \_\_\_\_\_  
ex) むせ増加、食事量低下、午後の倦怠感

## 共有事項 / 次回申し送り

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

ex) 午前は悪心強く午後が動きやすい / 次回も食後30分で再確認