

# MSA-P / MSA-C 初回評価5分フロー記録シート

破綻点・安全域・条件固定を1枚で記録

## 基本情報


患者ID \_\_\_\_\_ 評価日 \_\_\_\_\_

評価者 \_\_\_\_\_ 場所 \_\_\_\_\_

### 1. 赤旗確認 (該当時は中止・報告)

- 前失神・失神       急な呼吸苦      対応メモ \_\_\_\_\_
- 湿性嘔声・むせ増悪       強いふらつき急変      \_\_\_\_\_

### 2. 初回5分フロー (安全と方向づけを優先)



### 3. MSA-P / MSA-C 評価優先順位の比較

観点	MSA-P 優位	MSA-C 優位	記録の要点
転倒・歩行	開始・方向転換・狭所で破綻	左右動揺・測定過大・予測困難	破綻点 / 安全域
上肢・ADL	動作緩慢・固縮で手間取る	協調性低下・手先操作が乱れる	主訴課題を1つ固定
OH	離床制限の要因になりうる	ふらつきと混同しやすい	姿勢・症状・回復
嚔下・疲労	小声・むせで負荷量が変わる	姿勢不安定と絡みやすい	食後・会話後の変化

### 4. 初回評価記録欄 (次回比較できる形で残す)

病型のあたり	<input type="checkbox"/> MSA-P優位 <input type="checkbox"/> MSA-C優位 <input type="checkbox"/> 混在 <input type="checkbox"/> 判断保留 _____
破綻点・安全域	歩き出し / 方向転換 / 停止 / 体幹動揺 / 前失神 / むせ など _____
条件固定	時刻・内服後・食前後・補助具・靴/装具・介助量 _____
次回確認	同じ条件で見る項目、チーム共有したい注意点 _____

### 5. 再評価メモ・チーム共有

前回との差分 _____ _____ _____	次回の観察ポイント _____ _____ _____
-----------------------------------	--------------------------------------