

橈骨神経麻痺 | 脳梗塞ミミック 5分評価フロー

患者ID / 氏名	_____
評価日 / 評…	_____
主訴 / 発症…	_____

1. 先に確認：中枢赤旗と緊急共有

確認	中枢赤旗（該当時は医師へ共有）
<input type="checkbox"/>	意識・言語・顔面・視野・注意の新規所見
<input type="checkbox"/>	反射亢進・痙縮・クローヌスなど UMN 徴候
<input type="checkbox"/>	進行性悪化 / 強い頭痛 / 他部位症状

2. 5分チェック：中枢を外さず、末梢分布を並べる

① 中枢 言語・顔面・意識・注意	② UMN 反射亢進・痙縮・クローヌス	③ 分布 背屈・MP伸展・母指伸展	④ 感覚 手背橈側～後前腕	⑤ レベル 肘伸展・腕橈骨筋・回外
----------------------------	-------------------------------	-----------------------------	-------------------------	-----------------------------

メモ _____

3. 鑑別メモ：中枢らしさ / 橈骨神経らしさ

観点	中枢で見える	末梢で見える	所見メモ
症状の広がり	顔面・言語・注意も確認	伸展系に限局しやすい	
反射・筋緊張	亢進 / 痙縮 / クローヌス	弛緩性に見えやすい	
運動分布	共同運動や分離低下	背屈・MP伸展・母指伸展	
感覚	皮質性感覚 / 注意が混在	手背橈側左右差（PINは乏しいことあり）	

4. 3行記録：所見と次の一手を残す

①中枢所見 _____ _____	再評価ポイント <input type="checkbox"/> 背屈・MP伸展の変化 <input type="checkbox"/> 感覚左右差 / しびれ <input type="checkbox"/> 装具の皮膚トラブル <input type="checkbox"/> ADLで使えた場面 次回メモ _____
②末梢分布 _____ _____	
③次の一手 _____ _____	