

やる気スコア 記録用紙

Apathy Scale | 設問本文なし・記録 / 集計専用 | v5

基本情報

患者ID _____	評価日 _____
評価者 _____	場所 _____

評価前の確認・実施方式

当日の状態・比較条件 ☐ 疼痛 ☐ 眠気・覚醒低下 ☐ せん妄・認知状態の変化 ☐ 薬剤変更 ☐ その他の体調変化 ☐ 特になし	実施方式 ☐ 自己記入 ☐ 面接・読み上げ ☐ 初回 ☐ 再評価 本人が回答。家族・スタッフによる代理回答とは区別
--	---

採点表（14項目）

No	点数 0 1 2 3	所見メモ
1	☐ ☐ ☐ ☐	
2	☐ ☐ ☐ ☐	
3	☐ ☐ ☐ ☐	
4	☐ ☐ ☐ ☐	
5	☐ ☐ ☐ ☐	
6	☐ ☐ ☐ ☐	
7	☐ ☐ ☐ ☐	
8	☐ ☐ ☐ ☐	
9	☐ ☐ ☐ ☐	
10	☐ ☐ ☐ ☐	
11	☐ ☐ ☐ ☐	
12	☐ ☐ ☐ ☐	
13	☐ ☐ ☐ ☐	
14	☐ ☐ ☐ ☐	

合計・解釈・共有

合計 / 42 点	日本語版の目安：16点 脳卒中患者を対象とした日本語版研究で検討されたカットオフ	一言まとめ _____ _____
--------------	---	-------------------------

16点以上のみでアパシーを確定せず、臨床所見・当日の状態・経時変化とあわせて解釈します。原版では14点が報告されていますが、対象集団・版が異なるため、日本語版脳卒中研究の16点と混同しないよう注意してください。

再評価メモ / 共有事項

比較条件・解釈メモ 例：疼痛あり / 眠気あり / 薬剤変更後 / 面接方式 _____ _____	次回評価 状態・介入・治療条件の変化や、経時変化を確認したい時点で設定 予定：_____ 条件：_____
---	--

根拠：岡田和悟ほか．やる気スコアを用いた脳卒中後の意欲低下の評価．脳卒中．1998;20(3):318-323．本用紙は設問本文を掲載せず、記録・集計・経時比較のために作成しています。